

SOP-027 | 10.0

Καταλληλότητα για σωλήνα εντερικής σίτισης

Suitability for an enteral feeding tube

Φαρμακευτική αξιολόγηση συγκεκριμένης συνταγής/μορφής πριν από χορήγηση μέσω σωλήνα· δεν καθορίζει θεραπευτική δόση.

Pharmaceutical assessment of the actual order/form before tube administration; does not set a therapeutic dose.

Διαδικασία / Procedure

- Επιβεβαιώστε με την κλινική ομάδα τον ασθενή, το φάρμακο, τη θέση άκρου σωλήνα, διάμετρο/υλικό, σίτιση και περιορισμό υγρών.
- Confirm patient, medicine, tube end site, bore/material, feed and fluid restriction with the clinical team.
- Αναζητήστε οδηγίες του ακριβούς εγκεκριμένου προϊόντος. Μην συνθλίβετε τροποποιημένης αποδέσμευσης ή εντεροδιαλυτή μορφή χωρίς ειδικά κατάλληλα τεκμήρια.
- Seek instructions for the exact authorised product. Do not crush modified-release or enteric-coated forms without specific suitable evidence.
- Αξιολογήστε διαλυτότητα/διασπορά, σωματίδια, ιξώδες, ωσμωτικότητα, έκδοχα και απώλεια δόσης στο συγκεκριμένο σύστημα. Η υγρή μορφή δεν εγγυάται μη απόφραξη ή ίδια απορρόφηση.
- Assess dissolution/dispersion, particles, viscosity, osmolality, excipients and dose loss in the actual system. A liquid form does not guarantee freedom from blockage or unchanged absorption.
- Επιλέξτε συμβατή εντερική συσκευή/προσαρμογέα και επαληθεύστε τη μικρότερη λήψη. Μελετήστε ανάκτηση και έκπλυση όπου χρειάζεται, χωρίς να προσθέτετε αυθαίρετη δραστική για αντιστάθμιση.
- Choose a compatible enteral device/adaptor and verify the smallest withdrawal. Assess recovery/rinsing where needed without arbitrary extra active to compensate.
- Οι γραπτές οδηγίες χορηγούν τα φάρμακα χωριστά. Η κλινική ομάδα ορίζει κατάλληλο νερό, όγκους έκπλυσης και αναγκαία διακοπή σίτισης για το συγκεκριμένο φάρμακο/ασθενή.
- Written instructions administer medicines separately. The clinical team defines suitable water, flush volumes and necessary feed interruption for the medicine/patient.
- Καταγράψτε στο F-021 τις πηγές, αποφάσεις, περιορισμούς και παρακολούθηση. Αλλαγή σωλήνα, θέσης χορήγησης ή μορφής απαιτεί νέα αξιολόγηση.
- Record sources, decisions, limitations and monitoring in F-021. A change of tube, administration site or formulation requires reassessment.

Κριτήριο διακοπής / Stop criterion

Άγνωστη συμβατότητα, αβέβαιη δόση ή οδηγίες μη προσαρμοσμένες στον ασθενή: μη δήλωση καταλληλότητας σωλήνα.

Unknown compatibility, uncertain delivery or nonindividualised instructions: do not declare tube suitability.

Σχετικά έντυπα / Related forms: F-021, F-001, F-018

Πηγές και παραπομπές / Sources and references

[1] NHS SPS - Choosing medicines for enteral tube administration

Current NHS Specialist Pharmacy Service professional advice, checked 14 October 2026 | Tube characteristics, licensed options, formulation issues and administration site | Clinical/pharmaceutical assessment for actual tube and formulation; general advice cannot establish the

suitability of an untested compounded preparation. | 2026-10-14

<https://sps.nhs.uk/articles/choosing-medicines-for-enteral-tube-administration/>

[2] NHS SPS - Administering a medicine through an enteral feeding tube

Published 18 September 2025; updated 9 February 2026 | Water, ENFit syringe, dead-space, separate medicines and flushing | Administration principles; fluid volumes, feed interruptions and water choice must be patient-specific, especially in children and fluid restriction. | 2026-10-14

<https://sps.nhs.uk/articles/administering-a-medicine-through-an-enteral-feeding-tube/>

[3] NAPRA - Guidance Document for Pharmacy Compounding of Non-sterile Preparations

March 2018, clarification January 2022 | Sections 5, 6 and 7; master/batch records, delivery, quality | Quality-system implementation; historical BUD table not substituted for 2022 USP revision | 2026-10-14

<https://www.napra.ca/wp-content/uploads/2018/03/NAPRA-Mdl-Stnds-Pharmacy-Compounding-Nonsterile-Preparations-Guidance-EN-March-2018-CLAR-Jan-2022.pdf>